



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

от « 16 » сентября 20 17 г.

№ 509

О проведении мониторинга
по ГРИППу, ОРВИ и принятии
мер безопасности

В соответствии с письмом Министерства образования по Иркутской области от 06.10.2017г, №02-55-6508/17 «О принятии мер безопасности», руководствуясь п.п.15.10, п.15 раздела 5 Положения «Об управлении образованием администрации Иркутского районного муниципального образования», утвержденного Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 28.12.2016 №31-275/рд,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Руководителям образовательных организаций:

1.1.Усилить утренний фильтр для выявления детей и сотрудников с клиникой ГРИППа и ОРВИ.

1.2. Организовать мониторинг вакцинации, посещаемости и количества отсутствующих детей в образовательных организациях по причине ГРИППа и ОРВИ с проведением мероприятий и приостановлением учебного(образовательного) процесса при отсутствии 20% детей по причине ГРИППа(ОРВИ), с целью прерывания распространения инфекции как в целом по образовательной организации, так и классе (группе), с информированием Управления образования еженедельно по четвергам до 12 часов на электронный адрес irkutskruo_minaeva@mail.ru или по телефону 718-038, для Ткачева А,Н – ведущего инженера по охране труда(приложение 1, 2).

1.3.Провести дополнительное обучение работников по тактике при выявлении и отстранения детей с симптомами респираторного заболевания.

1.4.Ежедневно, до отмены мероприятий, проводить влажную уборку помещений с применением дезсредств в соответствии с инструкцией по их применению.

1.5.Обеспечить дополнительные меры по обеззараживанию воздушной среды: увеличить кратность проветривания помещений, применение рециркуляторов и бактерицидных облучателей, строго в соответствии инструкциями по эксплуатации данного оборудования.

1.5.Активировать разъяснительную работу с родителями по вопросам профилактики ГРИППа и ОРВИ, обратив особое внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью в случае заболевания ребенка с вызовом врача на дом.

1.8.Разместить информационные бюллетени по профилактике гриппа и ОРВИ на стендах и интернет-сайтах организации(приложение 3).

1.9.Проводить ежедневный мониторинг соблюдения теплового режима;

1.10.Усилить контроль над источниками тепло-и-электроснабжения и обеспечить их безаварийную работу;

1.11.Организовать дежурство рабочих по обслуживанию здания, с целью недопущения разморозения систем водоснабжения и отопления.

1.12.Ограничить посещение образовательных организаций:

- ученикам начальных классов при температуре - 30°C;

- обучающимся 5-9 классов – при температуре - 35°C;

- обучающихся 10-11 классов 40°C и ниже;

1.13.Не проводить уроки физической культуры на улице при температуре воздуха ниже:

- 10°C - 11°C в 1 – 4 классах;

- 12°C - 15°C в 5 – 9 классах;

- 16С в 10 – 11 классах;

При определении температуры воздуха следует учитывать наличие и направление ветра, атмосферное давление.

2.Еженедельно, в четверг ведущему инженеру по охране труда Ткачеву А.Н, направлять сводную ведомость по вакцинации и мониторингу ГРИППом и ОРВИ в Министерство образования Иркутской области.

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации ИРМО Бурбанова Д.И

И.О.начальника Управления образования



И.В.Ткачева

Мониторинг ВАКЦИНАЦИИ по ГРИППу по образовательным организациям по состоянию на _____
 (предоставляется еженедельно каждый четверг до 12 часов, до 10 декабря 2017 года по тел.718-038 или на электронную почту: irkutskruo_minaeva.ru, для Ткачева А.Н)

1. Мониторинг вакцинированных лиц против гриппа

Наименование МОУ (МДОУ)	Общее количество обучающихся (воспитанников)	Из них количество вакцинированных	% от общего количества обучающихся (воспитанников)	Отказ от вакцинации (человек)	Общее количество работников	Из них количество вакцинированных	%










Мониторинг по ГРИППу и ОРВИ по образовательным организациям по состоянию на _____
 (предоставляется еженедельно каждый четверг до 12 часов, до 10 мая 2017 года по тел.718-038 или на электронную почту: irkutskruo_minaeva.ru, для Ткачева А.Н)

1. Мониторинг заболеваемости ГРИППом и ОРВИ

Наименование образовательной организации	Общее количество обучающихся (воспитанников)	Всего болеют (чел.)	В том числе			Режим карантина (указать класс(группа), период карантина)
			ГРИПП/ ОРВИ	%	Другое	

ГРИПП ИЛИ ОБЫЧНАЯ ПРОСТУДА?



Признаки болезни	ОРЗ	ГРИПП
 <p>Начало болезни</p>	<p>Постепенное</p>	<p>Обычно резкое, некоторые даже могут назвать час, когда почувствовали, что заболевают</p>
 <p>Температура</p>	<p>Повышается постепенно и незначительно, редко бывает выше 38,5С.</p>	<p>Буквально за несколько часов может подскочить до 39-40 градусов и даже выше. Высокая температура держится 3-4 дня</p>
 <p>Симптомы интоксикации</p>	<p>Общее состояние обычно не страдает</p>	<p>Резко нарастают озноб, обильное потоотделение, головная боль, светобоязнь, головокружения, ломота в мышцах и суставах</p>
 <p>Насморк</p>	<p>Есть и весьма обильный. Часто преобладает над другими симптомами</p>	<p>Обычно не бывает. Часто лишь небольшая заложенность носа, которая появляется ко второму дню болезни</p>
 <p>Боль в горле, покраснение</p>	<p>Почти всегда сопровождает простуду, потому как идет активное воспаление слизистых оболочек носоглотки</p>	<p>В первые дни болезни не всегда. Обычно бывают заложены задняя стенка глотки и мягкое небо</p>
 <p>Кашель, ощущение дискомфорта в груди</p>	<p>Часто отрывистый, сухой, который проявляется с самого начала заболевания, боли в груди отсутствуют</p>	<p>На 2-е сутки болезни возникает мучительный кашель, боль за грудиной по ходу трахеи</p>
 <p>Чихание</p>	<p>Очень часто</p>	<p>Бывает редко</p>
 <p>Покраснение глаз</p>	<p>Редко, при сопутствующей бактериальной инфекции</p>	<p>Довольно частый симптом</p>
 <p>Астенический синдром (слабость)</p>	<p>Во время болезни слабость есть, но после выздоровления незначительна и быстро проходит</p>	<p>Утомляемость, слабость, головная боль, раздражительность и бессонница могут сохраняться на протяжении 2-3 недель после окончания болезни</p>